

35

نشرة رقم:

# البرنامج المتكامل لخدمة اشجار الرمان



|   |                          |
|---|--------------------------|
| <p>1. البدء بالعمليات الزراعية كالحراثة بشكل كنتوري لتجميع مياه الامطار حول الاشجار في الاراضي المنحدرة .</p> <p>2. اضافة الاسمدة العضوية المتخمرة للاشجار بمعدل 5 كغم سماد حول ظل الشجرة مع مع زيادة الكمية مع تقدم العمر حتى تصل حتى 50 كغم وذلك بواقع 5 كغم لكل سنة من عمر الشجرة مع اضافة 1 كجم سوبر فوسفات مع بداية تساقط الامطار .</p> <p>3. ازالة السرطانات مع الاهتمام بمكافحة الاعشاب بمبيدات الاعشاب مثل مادة راوند اب او تايفون بمعدل 4-5 سم لكل لتر ماء مع بداية ظهور الاعشاب .</p>   | <p><b>كانون اول</b></p>  |
| <p>1. اضافة الاسمدة العضوية في حالة عدم اضافتها والاستمرار في اضافة الاسمدة الفوسفاتية بواقع 1 كغم للندم مع مراعاة اضافة الاسمدة الكيماوية المركبة مثل سماد 13/13/13 بمعدل 1/3 كغم للشجرة من اواخر شهر كانون ثاني حتى أوائل شهر شباط بفترة زمنية كل 15-20 يوم مع اضافة سماد سلفات الامونيا مرتين مع الاسمدة المذكورة بواقع 100-150 غرام للشجرة .</p> <p>2. تقليم وازالة السرطانات والافرع الجافة والمكسورة وفتح قلب الشجرة وذلك او اواخر شهر كانون ثاني .</p> <p>3. رش الزيوت الشتوية الضرورية لمكافحة البياض الشتوي للحشرات وتوحيد الازهار وتبيخيره وذلك خلال اواسط حتى اواخر شهر شباط</p>   | <p><b>كانون ثاني</b></p> |
| <p>1. الانتهاء من التقليم وازالة السرطانات</p> <p>2. الاهتمام با الري بعد التقليم ومن الافضل اعطاء الاشجار رية غزيرة في الفترة قبل خروج النموات الخضرية والزهرية في حالة توقف الامطار.</p> <p>3. الاستمرار في اضافة الدفعة الثانية من السماد الكيماوي المركب 13/13/13 بمعدل 200جم سماد للشجرة مع سماد سلفات الامونيا بمعدل 100 غرام للشجرة .</p> <p>4. الاستمرار في مكافحة الحشرات والمن برش المبيدات الحشرية المناسبة التي لا تؤثر على حيوية الاوراق مثل مادة كنج فو بمعدل 1.5 سم لكل لتر ماء او مادة كونفدور من خلال تجريع الاشجار ويمنع استعمال هذه المواد خلال فترة الازهار لكي لا تؤثر على النحل خلال فترة الازهار .</p> <p>5. وفي حالة استفحال وجود حشرة المن يمكن استعمال احد المنظفات الكيماوية مثل مادة بالموليف او الصابون بمعدل 5سم/لتر لانها تستمر في قتل المن ومنع الاصابة مجددا من خلال اتلاف طبقة الكيوتيكال للمن وعدم استمراره مع تساقط الندى وتحافظ على حيوية الاوراق.</p> | <p><b>شباط</b></p>       |

|  |               |
|--|---------------|
| <p>1. بعد خروج النموات الخضرية والازهار تروى مرة اخرى ثم يمنع الري عن الاشجار حتى تعقد الازهار</p> <p>2. الاستمرار في اضافة الاسمدة خاصة المحتوية على البوتاس مثل سماد 11/8/20 وذلك لتكبير حجم الثمار .</p>  | <p>اذار</p>   |
| <p>1. الاستمرار في مكافحة الحشرات خاصة المن كما ذكر سابقا .</p> <p>2. اعطاء ريات مساعدة في حالة توقف الامطار وتجنب الري خلال الفترة الاولى من الازهار والبدء بالري من جديد بعد ظهور 40% من العقد الاولى للثمار .</p>   | <p>نيسان</p>  |
| <p>1. الاستمرار في ري الاشجار وعدم تعرضها للعطش مع اوسط حتى اواخر شهر ايار بواقع رية واحدة كل 15 يوم .</p> <p>2. البدء بالتسميد الكيماوي من اواخر شهر ايار باستعمال الاسمدة المركبة 13/13/13 بمعدل 100 غرام لكل شجرة مع اسمدة المخصلات العضوية بمعدل 50 غرام / للشجرة وذلك مرة كل 15-20 يوم حتى اوسط شهر تموز .</p> <p>3. استعمال الاسمدة الورقية في حالة ظهور اعراض نقص اسمدة على الاوراق .</p> <p>4. مراقبة حفار ساق التفاح ومكافحته باستعمال المصائد من قناني الكولا وتربية نموات جديدة بعد تقليمها وحرقتها ،</p> | <p>ايار</p>   |
| <p>1. استمرار الري المنتظم مرة كل 7-10 ايام بمعدل 7-10 كوب للدنم</p> <p>2. البدء بمكافحة ابو دقيق الرمان مع نهاية العقد وذلك برش مادة كنج فو بمعدل 1.5 سم /لتر مرة 20-25 يوم حتى اوائل شهر تشرين اول وقبل فترة القطف ب 20 يوم .</p> <p>3. الاستمرار في السماد الكيماوي كما ذكر في البند 2 من شهر ايار .</p> <p>4. الاستمرار في مراقبة حفار ساق التفاح ومكافحته باستعمال المصائد من قناني الكولا .</p>  | <p>حزيران</p> |
| <p>1. الانتظام في الري ومكافحة ابو دقيق الرمان .</p> <p>2. الاستمرار في ازالة السرطانات .</p> <p>3. اضافة الاسمدة البوتاسية مثل السماد المركب 11/8/20 بمعدل 100 غرام / شجرة مع اسمدة المخصلات العضوية بمعدل 50 سم / شجرة .</p> <p>4. الاستمرار في مراقبة حفار ساق التفاح ومكافحته باستعمال المصائد من قناني الكولا حتى اوائل شهر كانون اول.</p>  | <p>تموز</p>   |

|  |            |
|--|------------|
| <p>1. جمع المحصول في الاصناف المبكرة .<br/>2. الاستمرار في الري خاصة للاشجار المتأخرة النضج مع اضافة الاسمدة المركبة بواقع مرة كل 15 يوم .</p> | أب         |
| <p>1. المحافظة على الري وانتظامه مع مراعاة تخفيف الري تدريجيا من اواسط شهر ايلول حتى اواسط شهر تشرين اول .</p>                                 | ايلول      |
| <p>1. جمع المحصول لثمار المتأخرة<br/>2. الاستمرار في الري الخفيف بعد جمع المحصول لدفع الاشجار الي الدخول في طور الراحة .</p>                   | تشرين اول  |
| <p>1. الاستمرار في تقليل ومنع الري الاشجار</p>   | تشرين ثاني |

×× يرجى مراجعة المرشد الزراعي المختص في مديريات الزراعة لتحديد أنجع طرق المكافحه الكيماويه والتأكد من قائمة المبيدات المسموح باستخدامها.



السلطة الوطنية الفلسطينية  
وزارة الزراعة

إعداد: م. فراس ارشيد

الادارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية

حقوق الطبع محفوظة © ٢٠١٢



برنامج تحسين مستوى المعيشة في الاراضي الفلسطينية المحتلة- الضفة الغربية،  
بتمويل من مكتب المظلة الهولندية

